

ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE



De bonnes observations doivent être suffisamment répétées. Zimmermann. tr. de l'exp.
par le C. Guigon Gueydon chirurgien major des armées de l'état et
de l'Université de Montpellier.

Observation d'un Cancer.

de la mamelle, guéri par l'amputation n° 175.

3/78
179
180
Le volume de la tumeur a quelque fois arrêté les anciens
Maîtres de l'art dans l'amputation des mamelles, celle-ci avoit
droit d'ébranler le chirurgien le plus intrépide, par l'énormité
de la masse, par la largeur de sa base et par la sensibilité
de la malade. Le virus cancéreux qui faisoit craindre la récurrence
de la maladie augmentoit le découragement, et l'on verra combien
ce virus a été difficile à dompter pendant une année que la
plaie de l'amputation a resté de se cicatriser.

Madame mege, pour m'informer des causes qui pouvoient
avoir donné lieu à la maladie, me fit le détail suivant. Des
chagrins domestiques, qui duroient depuis long tems, et une frayeur
subite, lui occasionnerent une suppression de menstrues pendant
trois mois, au bout des quels, il survint une perte de sang qui
ne plus reparut depuis et les règles ont continué de fluir tous
les mois. quatre ans après elle s'aperçut, pour la première fois

ARC 49 n° 4

D'une glande de la grosseur d'une fève de haricot, Située à la partie Supérieure de la mamelle. elle ne pût attribuer à aucun loup, ni à aucune chute la première apparition de cette glande; mais elle eut quelques soupçons de s'être trop serrée avec des habillements étroits.

M.^{de} mege porta une année cette glande, qui augmenta du double, et pendant le tems, elle fut attaquée d'une ictere très considérable, qui céda pourtant aux remèdes appropriés. Six mois après, elle reçut un coup de coude sur le sein et la glande augmenta jusques à la grosseur d'un œuf de poule. le volume commençoit à l'inquiéter, elle consulta le chirurgien major de la marine, qui jugea que la tumeur étoit un Cancer commençant et il administra, sans succès, des remèdes relatifs à cette maladie.

Les fausses idées que la malade avoit conçues des gens de l'art, lui firent écouter les propositions flatteuses des charlatans et elle appliqua malheureusement une foule de remèdes sur son sein. elle y mit d'abord de l'eau froide pendant quinze jours ensuite, qu'elle renouvelloit plusieurs fois par jour. la grosseur de la glande se soutint pendant l'usage de ce remède, et elle devint douloureuse, surtout lorsque la malade éprouvoit quelque

contrariété. elle appliqua ensuite une forte dose d'alkalis volatils affoiblit avec la décoction d'isrophulaire et elle en avaloit six gouttes par jour dans un verre de la même décoction. l'usage de ce remède, pendant quatre mois, augmenta beaucoup la tumeur et la confondit avec tout le corps de la ~~malade~~ ^{mamelle}. enfin un moine guérisseur de cancer, appliqua sur le sein du miel, du faillé, une poudre mystérieuse, un cataplasme et dans la suite un emplâtre fondant, lequel multiplia les symptômes et augmenta singulièrement la maladie.

Après l'insuccès de toutes ces applications, je fus chargé de la malade. la tumeur étant d'un volume effroyable, gênoit beaucoup la respiration et on étoit obligé de la soutenir, ~~par~~ par des bandes qui passaient sur les épaules. la peau qui la couvroit y étoit fort adhérente, d'une couleur brune plombée et parsemée d'un grand nombre de gros vaisseaux variqueux. cette tumeur à base très large, étoit dure et douloureuse. cependant elle n'étoit pas adhérente à la poitrine, les glandes axillaires n'étoient pas tuméfiées et la malade étoit réglée avec abondance.

Convaincu que pour la cure radicale de cette maladie



il ne restoit plus que l'amputation, je fis assembler en consultation m. m. manne, hutre, verquin et boyer Chirurgiens expérimentés, qui décidèrent que l'amputation de la mamelle étoit un remède douteux, mais indispensable et urgent.

J'accélérai donc les préparations à cette grande opération. je fis prendre ^{à la malade} deux bains par jour dans lesquels elle restoit une heure le matin et autant le soir, mais l'idée des douleurs avenir, inséparables d'une semblable amputation, nuisoit plus que les bains et autres préparations ne pouvoient apporter ~~et~~ de calme et de soulagement: ainsi, après cinq jours, je purgai la malade pour l'opérer le sur lendemain.

opération

Le jour de l'opération, 28. mai 1785, je fis prendre un bain à la malade et un grain d'opium pour tâcher de modérer la sensibilité qui étoit excessive; j'employai toute la confiance qu'elle avoit en moi pour lui persuader que la douleur de l'opération seroit très courte et la cure radicale; enfin je lui évitai l'aspect d'un lit de misère, en la faisant assise sur les genoux d'un aide qui la penchoit en arrière, en s'y penchant lui-même. elle fut soutenue dans cette position par d'autres aides, un ~~deux~~

autre étoit prêt à présenter les instruments et le plus intelligent soutenoit la tumeur avec les deux mains, pour lui faire faire les mouvements qui devoient me faciliter l'opération.

je me placai au côté gauche de la malade et de ma main droite, armée d'un bistouri légèrement convexe, de cinq pouces de long et fixe dans son manche, je commençai l'incision à la partie inférieure et externe de la tumeur; je parcouru toute la partie inférieure, la partie interne, et je parvins à la partie supérieure en coupant contre moi et ne pénétrant que jusqu'au tissu cellulaire. alors je disséquai promptement la tumeur en procédant de dedans en dehors, guidé par mes doigts et les fibres du grand pectoral; parvenu à la partie moyenne de ce muscle, j'achevai l'incision circulaire de la tumeur en descendant de la partie supérieure à l'inférieure par la partie externe: enfin je séparai, par ce procédé, la tumeur de la poitrine en deux minutes à peu près.

Les rameaux artériels que la mammaire interne envoie dans les espaces intercostaux, furent ceux qui donnèrent le plus de sang; j'y fis d'abord appliquer dessus, les doigts d'un aide, qui froissa un peu le bout des artères et après j'y



appliquai un morceau d'agaric soutenu d'un tampon de charpie et d'une compresse. je couvris la plaie d'une grande quantité de charpie pour égaliser l'élévation de l'autre mamelle et afin d'en modérer la pression; je soutins cette charpie avec une large compresse et un bandage de corps. je fis mettre la malade dans son lit et je plaçai la main d'un aide sur le bandage pendant les premières vingt quatre heures.

anatomie de la tumeur

Le poids de cette masse un moment après l'opération, fut de douze livres et dix onces, la base qui répondoit au grand pectoral, présentoit la coiffe aponevrotique qui enveloppe le corps glanduleux de nuck. je fis l'ouverture de ce corps et je trouvai qu'il étoit d'une couleur jaunâtre, dont la teinte augmentoit par des lames concentriques à mesure ^{qu'elle} s'approchoit du noyau de la tumeur. Ce noyau gros comme les deux poings, étoit d'une texture celluleuse et d'une consistance assez faible pour que le doigt indicateur étendu la déchira aisément. elle étoit de plus traversée par des sinus de quatre pouces de long sur quatre ou cinq lignes de large, lesquels étoient remplis d'une matière

septique, roussâtre et légèrement visqueuse. le trajet de ces sinus passoit fréquemment au dessous des grands vaisseaux pariqueux de la tumeur, en sorte que le plus petit délai auroit vraisemblablement été cause de quelque hemorrhagie mortelle.

traitement de la plaie

une déperdition aussi considérable exigeoit les plus grandes précautions pour prévenir l'excès de sensibilité et l'éréthisme qui en auroient été nécessairement la suite : c'est pourquoi m'étant aperçu le lendemain de l'opération de quelques soubressauts dans les tendons, je fis une saignée, j'ordonnai quinze grains de sel sédatif et une infusion de fleurs de tilleul pour boisson ordinaire, le calme reparut.



Le second jour, le sang des artères ouvertes n'ayant que très peu pénétré l'appareil qui étoit cependant devenu dur et sec, je l'arrosai avec de l'huile. le pouls étoit fébrile et la malade fatiguée par l'insomnie, je prescrivis une Emulsion Cuite edulcorée avec six gros de Syrop de diacode qui ramena le sommeil.

Le sixieme jour de l'opération, 4^{me} du mois de juin, je decouvris entièrement la plaie, de laquelle j'avois journellement

Enlevé les morceaux de charpie que la suppuration détachoit, et que je remplaçois par des plumaceaux garnis, à l'envers, d'un ferat fait avec l'huile d'amandes douces. je mesurai ce jour là cette grande plaie, qui avoit dix pouces de long sur six de large; la couleur étoit d'un rouge tendre, enduite d'un pus louable. je ne la pansai plus qu'en deux tems, pour ne pas exposer à l'air une surface aussi étendue, et des bandelettes de ferat, que je mis aux bords de la plaie, remédièrent au tiraillement des brins de charpie qui s'y colloient. enfin la constipation de la malade m'obligea de lui prescrire un lavement.

Le 10.^{me}, la malade eut ses règles jusqu'au 16.^{me} et ce ne fut qu'après cette évacuation, le 20.^{me} jour de l'opération, que les bords de la plaie commencèrent à s'amincir: je les soutins alors avec des morceaux d'sparadrap.

Tout se passa fort bien jusqu'au 25.^{me}, mais à cette époque la malade fut très abattue, le poul devint petit et fébrile, le centre de la plaie parut d'un rouge plus foncé; le lendemain il fut brun et finalement grisâtre. toute la plaie devint douloureuse le 30.^{me}, la malade fut dans une grande anxiété ce jour là, elle détestoit toute sorte d'aliment excepté le lait, à l'usage

duquel elle fut mise pour toute nourriture, elle Supporta fort bien cet aliment; la plaie se détorgea, l'anxiété se dissipa, l'insomnie fut moindre, la malade prit des forces et elle eut ses Règles le 5 juillet.

Dans le courant de ce mois, les bords de la plaie s'avancèrent beaucoup et elle avoit diminué de plus de la moitié. Lorsque le 22 juillet, huit jours avant l'apparition des règles, il survint tout à coup des nouvelles douleurs dans la plaie et des points grisâtres parsemés ça et là. Cependant tous ces points grisâtres se dissipèrent de nouveau et ne m'obligèrent pas à changer la nature des pansements que je faisois toujours à sec toutes les 26 heures et quelque fois avec une légère décoction de quinquina, lorsque je desirois donner un peu de ton aux chairs molles de la plaie.

Le 12 août la suppuration devint plus abondante et plus douloureuse, le bord antérieur et inférieur de la plaie fut très douloureux il s'ulcéra, la cicatrice se détruisit et cet ulcère ne reprit un bon aspect que le 21 par l'apparition des règles.

Le 9. 7^{bre} mêmes douleurs, même ulcération qui ne cessèrent que le 16 et les règles parurent le 20. néanmoins les grands soins que j'avois de la plaie, les pansements doux et à sec l'avoient



réduite à deux pouces de long. Sur un ponce et demi de large. —
des émenagogues que j'avois donné dans le courant de ce mois
ne changèrent rien à l'écoulement périodique, ni à la marche
ordinaire de la plaie.

La malade prit des bains pendant tout le mois d'octobre et,
cette fois-ci, elle n'eut point de douleurs à la plaie, quoiqu'il
survint encore quelque petits ulcères vers le haut de l'ancienne
cicatrice, lesquels ne durèrent pas long tems et n'empêchèrent pas
la plaie de se rétrécir. vers la fin du mois j'ouvris un cautère
au bras gauche de la malade.

L'époque menstruelle du mois de 9.^{bre} fut plus abondante qu'à
l'ordinaire et moins orageuse. j'avois purgé la malade au com-
mencement de ce mois, elle eut ses règles le huit et la plaie
n'éprouva presque aucun changement; mais il survint des maux
de cœur, des lassitudes et des douleurs dans les genoux, qui se
dissipèrent quelque tems après.

je cessai l'usage des bains pendant le mois de 10.^{bre}, ce qui fut
cause que les règles retardèrent de quelques jours, les douleurs de
la plaie revinrent, des nouvelles ulcérations reparurent, quoique le
cautère soula beaucoup.

convaincu de la nécessité des bains, je ne les discontinuai — plus pendant six mois; la plaie se cicatrisa entièrement, elle ne fut plus douloureuse à l'approche des menstrues et la malade jouit depuis lors d'une parfaite santé. elle a eu le courage de ne vivre que de lait pendant deux ans, de prendre une centaine de bains toutes les années et d'une ample boisson d'infusion à froid de feuilles de Chicorée de jardin.

Comme la Cause prochaine du Cancer paroit être l'épaississement des sucs albumineux, le menstrue le plus propre à opérer leur dissolution doit être naturellement l'eau. les alkalis auroient bien plus d'énergie que l'eau simple, si ces sucs albumineux étoient renfermés dans des matras ou dans des fioles; mais nos vaisseaux s'opposent aisément de leur présence et je crois que le dissolvant purement aqueux est préférable aux alkalis. néanmoins, même vit encore sans recidive de Cancer depuis 7 ans que l'opération lui a été faite. Cette remarque n'est pas sans intérêt si l'on fait attention que la plus part des personnes, à qui l'on a fait l'opération, succombent à une recidive au bout de deux ou trois ans et quelque fois plus tôt.





Observation sur un bubonocèle.



Je fus appelé le premier juin 1787 pour m. Grue' neg.^t de cette ville, âgé de 45 ans, d'un tempérament bilieux, maigre et atteint d'une hernie inguinale, incomplète avec étranglement.

quoique cette hernie ne parut au dehors que depuis trois heures, le malade m'apprit qu'il avoit eu autre fois une descente à cette partie, laquelle l'obligeoit de porter un bandage; mais depuis dix ans, ne s'étant plus aperçu de cette incommodité, il avoit négligé de faire usage d'un bandage. un fréquent exercice à cheval qu'il avoit fait la veille et des cris aigus qu'il venoit de pousser, quatre heures avant son accident, m'annonceront les causes éloignées et prochaines de cette hernie.

Mon premier soin fut de mettre le malade en situation et de faire rentrer cette tumeur, qui étoit petite, dure et très douloureuse; mais cette première tentative fut faite sans succès. je fis une ample saignée, tant pour calmer les vives douleurs et l'inflammation dont je craignois les suites, que pour faire tomber

la partie dans un relâchement, à la faveur duquel je me proposoit de faire de nouvelles tentatives. Ce beau calcul ne produisit que de nouvelles douleurs au malade, par le taxis que je crus être en droit de renouveler. enfin cédant aux obstacles que je ne pus vaincre, j'appliquai dessus la tumeur un cataplasme émollient qui calma un peu les douleurs; mais le vomissement, la douleur et le hoquet reparurent bientôt après et devinrent insupportables, la tumeur augmenta à vue d'œil, par les secoues que le Diaphragme de concert avec les muscles abdominaux, exercoient sur les boyaux.

Le soir j'employai un cataplasme avec les farines résolutives, une seconde saignée, un lavement avec la Cassie et le Sel d'Épson; mais j'aurois employé bien d'autres moyens que je n'aurois certainement pas opéré la réduction de la tumeur. je vis avec regret la hernie devenir Complète, la partie de l'aine s'infiltra, elle prit une couleur Rouge foncée qui se tendit jusqu'à la verge et sur toute la tumeur accident peu ordinaire dans les hernies, et que je n'avois jamais vu, principalement dans les premières vingt quatre heures.

Étonné des progrès aussi rapides de la part des accidens, j'examinai encore la tumeur qui avoit si fort augmenté; ie ne pouvois concevoir quelle force faisoit sortir le boyeau du ventre avec ~~autant~~

autant de facilité, tandis que j'avois employé tous les moyens raisonnables pour le faire rentrer. je jugeai bien que l'air dont la tumeur paroissoit être remplie pouvoit, en se rarifiant par l'inflammation et la chaleur de la partie, distendre le boyeau, le gonfler et l'attirer au dehors. D'après cette idée, je crus avoir trouvé le remède, en considérant que la glace condenserait cet air et en diminueroit le volume, ce qui permettroit à l'intestin de rentrer. Ce raisonnement tiré de la plus saine physique et les observations de chirurgie qui constatent le succès de cette pratique, me persuadèrent que je n'avois pas un moment à perdre pour employer le moyen qui paroissoit infailible; mais je le mis en pratique avec aussi peu de succès que les remèdes précédents. enfin je me lamentois du mal que je n'avois pu empêcher par le bien qui me restoit encore à faire, puisque celui-ci dépendoit entièrement de moi ou de mon adresse à faire l'opération.

La glace n'ayant pas été utile, devoit être très dangereuse par son séjour sur des parties enflammées: en conséquence j'appellai à mon secours m. m. Dutru et Boyer chirurgiens distingués pour assister à l'opération laquelle fut faite le 5^{me} jour après l'accident. Le terme qui ne pouvoit pas être plus court, d'après



tant d'observations qui attestent la rentrée de l'intestin six, huit jours après l'accident, fut encore trop long pour le boyeau.

Je fis placer le malade, comme je l'avois situé lorsque j'avois voulu opérer le taxis; je pinçai la peau au dessus de l'anneau, je fis une incision aux tegumens que je prolongai jusqu'au bas du scrotum et en haut jusqu'à un pouce au dessus de l'anneau. je disséquai ensuite feuillet par feuillet le tissu cellulaire du péritoine et j'en allois ouvrir la partie la plus declive, parce que je devois y trouver un peu de consistance qui facilité cette ouverture; mais un peu d'attention, en touchant cette partie me fit sentir plus d'élasticité que de fluctuation; cette considération m'arrêta et me fit juger que le sac étoit exactement collé à la tumeur, ce qui exigeoit quelques précautions de ma part pour ne pas ouvrir une partie qui pouvoit me conduire dans la cavité de l'intestin.

Exercé à manier l'scalpôt je me vouai à séparer les unes après les autres les lames du péritoine, en traçant des lignes imperceptibles sur la surface externe du sac. ce travail fut un peu long et pénible pour moi, mais il ne fut pas douloureux pour le malade, ce qui confirme une des expériences halleriennes.

à mesure que je loupais les lames externes du sac et que la

gorce morte jointe à la tension de la tumeur les écartoient, je découvris la couleur brune de l'intestin à travers la vraie lame du péritoine; je redoublai alors l'attention et je fus convaincu que l'intestin étoit altéré et collé au sac. je m'éloignai prudemment de la partie inférieure de la tumeur, qui, bien loin de contenir de la sérosité, faisoit au contraire effort contre la convexité du boyeau et adhéroit avec lui.

je trouvai au haut et au côté interne une petite inégalité que je reconnus pour être une portion de l'épiploon; j'incisai sur cette inégalité et pour lors j'eus ouvert le sac. je dilatai cette ouverture avec une sonde cannelée et le bistouri, mais quand j'eus pénétré dans cette poche, je trouvai une adhérence intime entre le sac, l'épiploon et le boyeau. la hernie avoit augmenté trop précipitamment pour que la sérosité fût épanchée au bas de la tumeur.

Je quittai mon instrument, je détachai avec mes doigts toutes les adhérences et les brides que le sac et l'épiploon formoient au tour du boyeau, lesquelles étoient en grand nombre et vraiment très anciennes. Cela fait, je renversai l'épiploon sur le bas ventre, je trouvai l'anse que le boyeau formoit

de la longueur de huit pouces, d'une couleur fort brune et ne contenant qu'une petite quantité d'air qui distendait beaucoup l'intestin. Je rangai ce boyeau du côté interne, tandis qu'avec l'ongle du doigt indicateur, je conduisais le bistouri pour débarrasser le pilier externe d'environ un pouce; mais je fus obligé de me servir d'une sonde cannelée pour la partie la plus profonde de ce pilier, car mon doigt devint insuffisant. Je retirai quelques lignes de l'intestin en dehors, pour voir s'il n'était pas adhérent à l'anneau; je reconnus qu'il avait été fortement étranglé dans cette partie, et à peu près comme s'il avait été serré avec une ficelle. Ceci explique pourquoi l'air qui distendait l'intestin ne rentroit pas tout de suite dans le canal alimentaire, malgré que la dilatation de l'anneau fut complète. Il fallut que je tirai doucement le boyeau pour faire rentrer cet air et bientôt après l'intestin que j'avais lavé avec du vin chaud, fut remis dans l'abdomen.

Qu'il me soit permis d'augurer que le malade aurait infailliblement péri par la gangrène, si je n'avais pas débarrassé l'intestin de l'air qui le distendait; car quoiqu'en disent quelques auteurs, la chaleur du ventre ne ravive pas toujours les

parties et le premier bien à procurer à l'intestin est un relâchement catartique, que l'absence des corps qu'il renferme produit nécessairement. Cet air n'auroit donc vraisemblablement pas vaincu les obstacles qu'il avoit à surmonter, si je dois en juger par les efforts menagés que j'ai été obligé de faire en le traçant. (a)

après avoir remis l'intestin, j'examinai l'épiploon que je trouvois fort altéré; je le pliai entre deux linges trempés dans du vin et je le renversai sur le ventre; je mis un linge fin sur la plaie, de la charpie molle par dessus et une Compresse soutenue d'un T. je fis faire une fomentation émolliente sur le bas-ventre; j'ordonnai une potion huileuse et le soir un lavement qui ne produisit pas un grand effet.

Malgré tous ces secours les accidens continuèrent. le lendemain de l'opération le poulx étoit petit, le hoquet fatigant, le vomissement fréquent, le malade prit un peu de vin pour ranimer les forces. j'examinai attentivement la plaie et comme je crus que la portion de l'épiploon, qui étoit renversée sur le ventre pouvoit être tirillée, quoique le tronc fût gléchi, je la soulevai et la relachai autant que je le pus en la faisant rentrer quelques

(a) M. Rich a trouvé sur le cadavre l'intestin retréci à l'endroit de l'étranglement. M. Desault vous a montré une pareille constriction en 1782 à l'hôpital de la Charité de Paris.



signes dans l'abdomen. le poul continuoît d'être petit, je Craignois la gangrene, j'ordonnai une forte decoction de quinquina à prendre. vers le soir le poul étoit presque entièrement effacé, le hoquet les extrémités et les vœux grôdes menaçoient d'une mort prochaine. alors je joignis à la forte decoction de quinquina une potion cordiale avec le Camphre et ces deux puissants anti-Séptiques ranimèrent un peu le malade; ils donnerent du ton à ces parties du boyeau à demy gangrenées, ils excitèrent la vitalité du Canal alimentaire et pendant la nuit le malade vint bien à la selle, lequi fît Calmer les accidens.

Le 2^e jour de l'opération le malade prit une Eau de Cassie aiguisée avec le sel d'epsom et il fît trois fois à la selle. la playe étant pansée à Sec dèsque la Suppuration l'eût perue, la cicatrice qui parvint le 30^e juin. à cette époque et même plusieurs fois auparavant, il survint des Coliques violentes avec tentions et douleur aux environs de la cicatrice; je Conseillai au malade une potion huileuse, un lavement et une légère friction sur la partie malade, tous ces accidens disparurent. huit jours après, les mêmes Symptomes revinrent je purgai doucement le malade avec un minoratif, lequi le soulagea parfaitement. cependant un grêle fut suivi à des Coliques fréquentes lorsqu'il mangeoit un peu plus, lequi annonçoit un retrecissement dans son boyeau et j'ai vu depuis qu'il étoit mort d'une colique.



Observation Sur un polipe

La nommée queyrard, âgée de 30 ans, se plaignoit d'une perte de sang depuis le 23 août 1791, lorsqu'elle me fit appeler le premier février 1792. je m'informai de son état et je voulus voir les linges dont elle se servoit pour recevoir la perte. je trouvai qu'une érosité abondante et sanguinolente suivie de douleurs violentes dans l'utérus et principalement vers l'aîne droite, pouvoient désigner un état contre nature de la matrice, ce qui me détermina à toucher la malade. je reconnus aisément l'existence d'un gros polipe, qui occupoit tout le vagin et dont l'origine venoit de la lèvre supérieure ou matrice de tache du côté droit.

La dureté de ce pédicule jointe aux grandes douleurs que la malade éprouvoit, l'éternuation, la petitesse du pouls et quelques accès de fièvre me le firent soupçonner cancéreux et m'empêchèrent assez pour différer pendant quinze jours d'en entreprendre la ligature. cependant l'art ne présentant aucun moyen assuré de soulager cette malade, en supposant le polipe

Cancereux, témoin d'ailleurs des progrès journaliers de la maladie, je voyois avec douleur échapper l'occasion de triompher des —
difficultés nombreuses qu'elle présentait, mais me référant au
conseil de Celſe et de Leuret j'entrepris la fixation —
quoique le succès dut en être incertain.

J'en fis donc la ligature le 18 février avec l'instrument —
à deux tuyaux de m. Leuret, tel qu'il est décrit dans les —
mémoires de l'académie de chirurgie; je ne le serrai que juques
au point où la malade me dit souffrir légèrement. mais à-
 peine eus-je sorti de la maison, que la douleur devint terrible,
une sueur froide couvrit toute la surface du corps, la faiblesse
et la syncope même portèrent l'éffroi dans le sein de la pauvre
de cette infortunée. j'arrivai au bout de trois heures et la douleur
paroissoit un peu diminuée, le poul étoit serré, petit et
fréquent et la perte d'une Prostate sanguinolente étoit très abondante.
je ne Craignis pas d'ordonner deux grains d'opium. parce que la
malade étoit déjà accoutumée à le remède. une injection de fleurs
deureau, une fomentation de feuilles de mauve sur le bas
ventre, une tisane de fleurs de la même plante et du bouillon
à quatre en quatre heures furent les moyens que je mis en usage

pour Concourir au Calme que je désirois procurer. la nuit
suivante fut un peu moins orageuse & ainsi que la malade dormit.

Le 2^e jour, la douleur étoit moindre, lequi m'en laissa à
faire deux tours de l'instrument, mais la douleur fut bientôt
considérable vers la région hypogastrique et le long de la Cuisse
droite, néanmoins sans tension au bas ventre. le Soir la malade
prit cinq grains de Camphre mêlés avec autant de nitre et réduit
en bols. la nuit fut très mauvaise.

Le 3^e jour, la douleur étoit continue et désespérante,
le pouls plus fréquent et plus dur m'obligea de faire une saignée
de 10 onces, qui ne diminua pas les douleurs. à Cinq heures du
Soir je fis encore deux tours de l'instrument pour accélérer la
section de quelques fibres nerveuses, qui étoient vraisemblablement
la Cause d'une douleur aussi constante que Cruelle. quatre heures
après j'ordonnai un grain et demy d'opium et la nuit fut moins
affreuse, puisque la malade prit un peu de Sommeil.

Le 4^e jour, la douleur fut moindre, mais il survint des
suffocations de matrice inquiétantes; la Corruption du Corps
polipeux et les Sucres putrides qui en découloient en étoient
en partie la Cause, c'est pourquoi j'animai les injections que



je répétai de quatre en quatre heures. je fis trois tours de l'instrument au bout duquel je sentis un petit baguement, ce fut la rupture du fil d'argent dont je ne m'en aperçus que le lendemain. la malade prit la même dose d'extrait d'opium, la nuit fut bonne et les douleurs se calmèrent.

Le 3.^{me} jour, je sentis que le fil d'argent étoit rompu, par la facilité que l'instrument avoit de tourner sur son axe. j'abandonnai cette ligature pour en placer une seconde, mais qu'il me soit permis ici d'entrer dans quelques détails, qui ne seront pas sans utilité pour les Chirurgiens, lors de portées des ouvriers habiles à construire les instruments déjà décrits.

Lorsque M. Levet eut donné au public la description de son instrument pour les polypes, chacun essaya de suivre ses traces dans la pratique; mais le manuel de l'opération prouva bientôt que cet instrument, tout simple qu'il étoit, avoit besoin d'être perfectionné et que la rupture du fil d'argent étoit un défaut majeur, auquel il falloit promptement remédier.

M. Herbiniaux qui l'éprouva, substitua au fil d'argent, une forte ficelle de chanvre; et, aux deux tuyaux, une seule canule percée par deux trous obliques de haut en bas, dans

Lesquels il introduisoit la ficelle, laquelle alloit se contourner sur un tourniquet transversal placé au bas de la Canule. Ce tourniquet est monté sur deux plaques d'argent, hautes d'un pouce, soudées aux deux Côtés externes de la Canule, il est muni d'une Clef que l'on emporte, pour que le malade ne puisse pas s'en servir. mais une roue, un ressort d'acier et une baffeule qu'il faut lui ajouter, compliquent un peu trop cet instrument.



m. Keck Divisa les deux tuyaux de m. Levret, il les reunit ensuite au moyen d'une gaine et il se servoit de la ficelle, du tourniquet transversal et du Cliquetage de m. Herbiniaux.

m. Levret Convaincu que la rupture du fil de métal étoit un défaut essentiel de son instrument, adopta la ficelle cirée, bannit la torsion et les nœuds que l'on faisoit dans le vagin. il imagina de disjoindre les deux tuyaux, de les courber et de les assembler par jonctions passées; de même que la plus part des pinces ou tenettes. Ces tuyaux sont du même calibre que les premiers, terminés Supérieurement en lame perçée, et inf^{er}ieurement en ouvertures dont les bords sont émoussés. il faut trois de ces instruments pour tous les Calibres des polypes.

m. Laugier proposa de disjoindre les deux tuyaux de

m. leuret, de les laisser droit, de leur en fixer un fixe tandis qu'avec l'autre il fait le tour du polipe; il joint ensuite les deux tuyaux au moyen d'une vis.

m. leuret improuve le treuil, le cliquetage de m. herbiniaux parcequ'il se rouille et qu'il est embarrassant, et il répondit à m. laugier que la désunion et la rectitude des tuyaux sont autant d'imperfection que la pratique réprouve.

voilà à peu près les changements que l'instrument de m. leuret a éprouvé. je n'avois point les trois instruments perfectionnés par cet auteur, je n'étois pas apportée de faire construire le treuil et le cliquetage de m. herbiniaux; j'avois seulement l'instrument à deux tuyaux fondés de m. leuret que j'employai, et j'éprouvai la rupture du fil d'argent. il n'étoit pas difficile de s'apercevoir que la rupture provenoit de ce que les deux fils en se tortillant, l'un sert de bobine, tandis que l'autre s'y roule dessus; que le premier est celui qui se casse, à cause qu'il ne se tord que sur lui même; et que c'est à le mécanisme qu'il faut rapporter la rupture, et non à des lacs rongeurs, contenus dans le vagin: comme on l'a déjà avancé. d'après cette idée je fis diviser le fil de métal sur une cheville placée en travers sur l'ouverture extérieure de l'un des deux tuyaux.

je conservai, par le moyen simple, l'usage du fil d'argent qui a
les avantages pour porter la ligature au pédicule du polipe; j'évitai
les douleurs que la torsion faisoit nécessairement souffrir et l'on aura
l'avantage que toute sorte d'ouvrier pourra fabriquer une simple
cheville à la tête de laquelle est une anse. voyez planche 1. mais
revenons à notre malade et à notre opération.

je placai cette seconde ligature, j'engageai le fil d'argent dans
l'anse de la cheville, je la roulai ensuite et je la fixai à l'anneau
du tuyau voisin, au moyen d'un petit ruban. Chaque jour je serrai
modérément et avec la plus grande facilité, la ligature du polipe; les
accidens et les douleurs furent infiniment moindres et le polipe
tomba le douzième jour de la première ligature. les fomentations
de fleurs de Sureau furent continuées encore huit jours, temps
au quel survint un léger écoulement de sérosité qui restoit et alors,
il ne fut plus question que d'employer les analeptiques pour restaurer
cette pauvre femme, que la diète, la perte et les souffrances avoient
extenuée.

je mesurai l'anse de la première ligature, qui tomba le même
jour que le polipe, et je jugeai que le pédicule avoit environ deux
pouces de diamètre le 18 février. néanmoins le succès de cette opération



prouve que malgré les douleurs cruelles, les accidents affreux
et la dureté de la polipe, qui le faisoit soupçonner l'arcanomateux,
il faut toujours préférer un remède incertain à une mort assurée.

